

CERCOPIDES DU MUSÉUM DE PARIS

Par le D^r V. LALLEMAND.

Machaerota Coomani Lall. n. sp.

Tête ocre brun pâle, avec stries transversales, ainsi que la partie médiane et supérieure de l'antéclypéus, brun noir brillant ; pronotum gris brun ; écusson chocolat, épine un peu plus foncée, une bande oblique de chaque côté (partant de chacun des angles postérieurs du pronotum), bord postérieur blanc jaunâtre. Sur les élytres, la base, le tiers du bord externe et le bord scrutellaire sont brun noir, la moitié basale est hyaline et la postérieure jaunâtre. Ailes hyalines. Prosternum brun clair ; méso et métasternum, ainsi que les deux premiers segments abdominaux ocre brun clair, les segments postérieurs et les organes génitaux sont brun clair. Pattes antérieures et médianes brun clair, cuisses postérieures brunes, tibias postérieurs ocres. Sur le clavus une seule nervure longitudinale, pas de nervure transversale. Forme de la proéminence de l'écusson voisine de celle de *M. philippensis* Baker (*Philip. Journ. Sc.*, XV, n° 1, pl. 1, fig. 2), mais le bord supérieur qui descend obliquement vers le pronotum est droit au lieu d'être incurvé. Le dessin des élytres est assez voisin de celui qui se voit chez *M. fusca* Baker (*Philip. Journ. Sc.* XV, n° I, pl. II, fig. 7).

Longueur jusqu'à la fin des élytres : 7,25 mm. — longueur jusqu'à la pointe de l'épine : 8,25 mm. — longueur jusqu'à la fin de l'abdomen : 5 mm.

Habitat : Tonkin, région de Hoa-Binh. (R. P. A. DE COOMAN).

Poophilus hebridensis Lall. nov. sp.

Antéclypéus et postclypéus ocres, le premier avec des stries transversales noires ; face supérieure de la tête toute plate, ocre légèrement brun, avec trois bandes brunes transversales, la première, qui peut s'effacer, est située sur le front et se compose de 2 taches transversales, la deuxième plus étroite, qui s'étend du bord antérieur d'un œil à l'autre et est interrompue en son milieu, la troisième la plus large, se trouve au niveau des ocelles. Pronotum, écusson, 2/3 antérieurs des élytres noirs, brillants, recouverts d'une villosité rousse ; sur le tiers postérieur, transparent, une tache jaune près du bord latéral, immédiatement en arrière de la partie noire, derrière cette tache une petite place hyaline, le restant est jaune plus ou moins brunâtre, les nervures y sont jaune clair. Rostre ocre, à extrémité brune ; brides brun noir ; toutes les cuisses, les tibias antérieurs et médians ocres ; tibias postérieurs, extrémité des tarsi et des épines noires. Sternum ocre, côtés du pro- et mésosternum brun noir. Segments abdominaux noirs bordés d'ocre. Nervures des élytres à peine indiquée sur les 2/3 antérieurs), sur le tiers postérieur elles sont saillantes et des-

sinent 4 cellules, l'extrémité est arrondie Pronotum densément ponctué avec légères rides, et trace de carène longitudinale. Face supérieure de la tête plane au moins un tiers plus courte que large en arrière ; front plus court que le milieu du vertex. Deux épines sur les tibias postérieurs

Longueur : ♂, 6 mm. ♀, 7 mm.

Habitat : Nouvelles Hébrides : I. Tanna, env. de Lamuemura ; I. Pentecôte, Mt Lerip. (E. AUBERT DE LA RÛE).

Clovia nova-britanniana Lall., n. sp.

Face supérieure de la tête brun noir, les tempes et la partie antérieure du front sont brunes ; sur le pronotum brun, une large bande transversale jaune, voisine du bord antérieur, plus large au milieu et s'étendant jusque près des bords latéro-antérieurs. Ecusson brun. Elytres noirs, sauf à peu près la moitié postérieure du clavus et la région voisine du corium, qui sont brunes, sur leur moitié antérieure une grande tache ovoïde jaune, qui s'étend en partie sur le clavum, en partie sur le corium, sans atteindre aucun bord ; sur la moitié postérieure, une bande oblique jaune, dirigée en arrière et en dedans, depuis le bord externe jusqu'à la nervure médiane. Face inférieure de la tête et sternum noirs ; de chaque côté de l'antéclypéus ainsi que des pro- et mésosternum, une bande jaune, qui sous le bord antérieur de la tête, se réunit à celle du côté opposé. Abdomen et pattes : bruns, avec places plus foncées. Partie supérieure de la tête plane un peu moins longue que large entre les yeux ; front plus long que la région du vertex sise derrière lui. Extrémité des élytres dessinant un angle dont le bord interne est droit et l'externe fort arrondi, 6 cellules apicales.

Longueur : 7 mm.

Habitat : Nouvelle-Bretagne.

Clovia pseudoscutellata Lall. n. sp.

Sur la face supérieure de la tête, 3 bandes transversales jaunes, l'espace entre celles-ci est brun, la première se voit derrière le bord antérieur, qui est noir, ses extrémités se réunissent à la deuxième qui s'étend au bord antérieur d'un oeil à l'autre, la troisième est située entre les yeux, le long du bord postérieur en passant immédiatement derrière les ocelles. Sur le pronotum brun clair, une bande transversale jaune qui s'étend d'un bord latéro-antérieur à l'autre et est bordée de noir en avant et en arrière. Ecusson brun clair avec trois taches jaunes, 2 petites derrière le bord antérieur, de chaque côté de la ligne médiane, la troisième, la plus grande, occupe la pointe. Elytre noir brun, sauf le long du bord scutellaire, le tiers postérieur du clavus, la région du corium voisine de celle-ci et le bord postérieur, qui sont brun clair ; ils montrent deux bandes jaunes, la première longeant la suture clavo-coriale jusqu'au niveau de la pointe de l'écusson, à cet endroit, elle se coude en angle obtus et se dirige en arrière et en dehors sur le corium, jusqu'un peu au-delà de la nervure radiale ; la seconde part du bord costal, s'incurve en dedans et en arrière et s'étend sur toute la partie noire brunâtre, qu'elle ne dépasse pas, son extrémité

est séparée du bord postérieur par la partie apicale brun clair. Antéclypéus ainsi que les pro- et mésosternum noirs, sur ceux-ci de chaque côté, une bande jaune, elles se réunissent en formant demi-cercle sous le bord antérieur de la tête ; le milieu de l'antéclypéus et du postclypéus est brun. Métasternum, abdomen et pattes : bruns. Extrémité des élytres arrondie, à nervures peu visibles. Très voisin de *C. acutellata*, s'en distingue par la bande postérieure des élytres qui dessine une ligne courbe au lieu d'être droite, et par la longueur de la face supérieure de la tête, qui est plus grande.

Longueur : 7 mm.

Habitat : Nouvelle-Bretagne.

Lallemandana mareana Lall., n. sp.

Face supérieure de la tête et pronotum ocre brunâtre clair, avec 2 assez larges bandes brunes, qui se continuent sur l'écusson, de ce fait, seule la ligne médiane de ce dernier est ocre. Face inférieure de la tête, pro- et mésosternum, pattes antérieures : ocre jaune ; le bord antérieur de la première, et les deux stries voisines, de chaque côté, sont noires ; métanotum et abdomen ocre brun clair, foncé sur les côtés. Pattes médianes et postérieures ocre brunâtre clair. Clavum brun très clair, sa partie externe à la nervure anale, le corium sur les 2/3 antérieurs, ainsi qu'une assez grande tache à l'extrémité sont brun foncé ; au bord costal, 3 taches blanches, une petite au milieu et deux autres sur le quart postérieur, la deuxième est la plus grande ; le tiers apical est transparent, brun très clair du côté interne, brun foncé et blanc du côté externe ; les nervures sont brun foncé. Sur les élytres les nervures médiane et cubitale sont soudées vers la base, à l'extrémité cinq cellules et le bord postérieur est arrondi. Face supérieure de la tête assez longue, seulement un peu moins longue que large entre les yeux ; front plus long que la partie du vertex qui lui est postérieure. A première vue, ressemble quelque peu à *Strandiana longipennis* Lall., mais la forme de la tête et le dessin des nervures des élytres la fait vite reconnaître.

Longueur : 8 mm.

Habitat : Iles Loyauté, I. Maré (Ph. FRANÇOIS).

Eurycercopis Auberti Lall. n. sp.

Jaune brunâtre clair, parsemé de petites taches noires sur sa face supérieure. A la partie antérieure du front, deux taches brun noir. Sur les élytres, au niveau de l'extrémité de l'écusson, une bande brun noir, qui traverse le clavus, puis s'étend sur le corium en arrière et en dehors jusqu'un peu au-delà de la nervure radiale ; sur la partie externe près du bord costal, des taches brun noir mal limitées. Anté et postclypéus brun noir, sur la première des stries latérales transversales jaune brunâtre clair, son bord supérieur et une bande transversale à la partie inférieure, ainsi que le tiers apical du second sont blanc jaunâtre, pouvant être très légèrement teintés de brunâtre. Pro- et mésosternum brun noirâtre ; métasternum ocre. Segments abdominaux brun noirâtre, bordés d'ocre. Toutes les

cuisse ainsi que les tibias antérieurs et médians avec bandes longitudinales ocre brun clair et brun noirâtre ; tibias postérieurs brun très clair ; tarsi brun noirâtre. Face supérieure de la tête un peu plus longue que large entre les yeux, plane ; front long, plus long que la partie du vertex, qui lui est postérieure. Ocelles très petits. Écusson plus long que large. Bord postérieur du pronotum fort concave.

Longueur : 6 à 6,5 mm.

Habitat : Nouvelles-Hébrides, île Pentecôte, Mt Lerip. ; île Epi ; île Vanôa-Lava. (E. AUBERT DE LA RÛE).

Literna vicina Lall., n. sp.

Face supérieure de la tête, pronotum et écusson : brun jaunâtre très clair ; élytres brun bronze pâle, plus foncés par places, principalement sur la moitié antérieure et sur les nervures en avant de la partie apicale ; la partie basale de la cellule costale et une grande tache plus ou moins triangulaire, au bord costal, en avant de la partie apicale, sont beaucoup plus claires. Face inférieure de la tête, pro- et mésosternum : noirs ; métasternum ocre. Segments abdominaux brun noir, bordés d'ocre en arrière ; organes génitaux ocres ; pattes ocres, avec des bandes brunes longitudinales sur les cuisses. Face supérieure de la tête plane, sans carène entre les ocelles ; la séparation du front et du vertex est peu visible. La fossette de l'antéclypéus assez large, à bords saillants, part de la base et occupe toute sa longueur, vu de côté, l'antéclypéus dessine un angle. Nervures des élytres assez saillantes et cellules concaves. Par sa coloration, elle rappelle *L. Signata* Jac., mais est plus petite, la configuration de la partie supérieure de la tête est différente, plus plate, sans carène et la fossette du clypéus occupe toute sa longueur. Très voisine aussi de *L. minuscula* Jac., s'en distingue par la taille plus grande, la coloration du vertex, du pronotum et de l'écusson beaucoup plus claire.

Longueur 6,5 mm.

Habitat : Madagascar : Ambatolaone (LAMBERTON). — Sainte-Marie (coll. NOUALHIER).

Type : ma collection. — *Paratype* : Collection du Muséum de Paris.

Litorna fusca Lall., n. sp.

Brun noir, plus clair sur la face supérieure de la tête et la partie médiane de l'antéclypéus ; rostre, hanches et cuisses médianes, ainsi que les pattes postérieures : ocre brun. Métasternum ocre pâle. Segments abdominaux bruns, bordés d'ocre pâle. Yeux blanc grisâtre. L'antéclypéus, vu de côté, dessine un angle obtus, il est transversalement aplati, son sillon longitudinal médian est profond et relativement étroit, partagé en trois par deux carènes obliques se trouvant à la partie supérieure, il y a ainsi deux petites fossettes triangulaires supérieures et un long sillon. Pas de carène sur la face supérieure de la tête ; ocelles très voisins. Nervures des élytres saillantes, 4 à 5 cellules apicales et tout autant de petites entre la radiale et la subcostale. Une épine sur les tibias postérieurs.

Longueur : 6,5 mm.

Habitat : Congo français : Ogooué, San Kita (R. ELLENBERGER),
3 ex.

Aufidus samoanus, var. **hebridianus** Lall., n. var.

Se différencie de l'espèce par une bande brune située le long des bords latéro-antérieurs du pronotum, une autre sur le corium, le long de la suture et une troisième réunissant l'extrémité de la tache apicale, qui est plus grande, au bord costal et enclosant avec elle un espace triangulaire ; le bord scutellaire est également brun.

Longueur : 7 mm.

Habitat : Nouvelles-Hébrides, I. Tana, I. Pentecôte, Mt Lerip.
3 ex. (E. AUBERT DE LA RÜE).

Aufidus samoanus var. **Wallisanus** Lall. n. var.

Se distingue par sa taille plus petite, 6 mm. au lieu de 7 mm., par la bande médiane s'étendant seulement jusqu'au radius et par une assez large bande brune à la partie apicale, qui est transversale, au lieu d'être oblique en avant et en dedans.

Habitat : Iles Wallis (D^r JOLY).

Laboratoire d'Entomologie du Muséum.